

Atractylis candida sp. nov.;

PAR M. A. CUÉNOD.

Il existe dans les environs de Tunis une forme remarquable d'*Atractylis* que j'ai déjà eu l'occasion de signaler antérieurement (Bull. Soc. bot. Fr., t. LVI, p. xvi, in Conférence d'ouverture de la Session extraordinaire en Tunisie). Comme elle fleurit à une saison où l'on n'herborise guère, je ne l'avais encore rencontrée que dans une seule station : au Cap Carthage au dessous de Sidi-bou-Saïd, elle existe certainement ailleurs; dernièrement je l'ai retrouvée près d'Hammam-Lif ce qui me l'a remise en mémoire et m'engage à la décrire. Cette belle forme, espèce ou variété, à laquelle je propose de donner le nom d'*A. candida* paraît voisine de *A. flava* Desf., avec laquelle elle est sans doute confondue. Elle en diffère par son port, par ses tiges robustes, jamais rameuses, toujours simples dès la base, par son tomentum aranéeux abondant et enfin par la *couleur blanche et la grande dimension* de ses capitules radiés. Si l'on veut n'en faire qu'une variété elle mérite toutefois une description spéciale :


***Atractylis candida* Cuénod (Planche XIV).**

Plante robuste, toute couverte d'un *tomentum blanc, cendré, aranéeux*. Souche épaisse, courte ligneuse, vivace. Racine pivotante longue de 20-40 cm. à écorce noirâtre. Feuilles des rosettes radicales fortement pennati-bipennatilobées, atténuées en pétiole, spinuleuses, peu rigides, ayant généralement disparu au moment de l'anthèse.

Tiges tantôt solitaires tantôt 3-5, robustes, ligneuses, généralement dressées, parfois ascendantes, *toujours simples*, atteignant 20-25 cm. très feuillées surtout dans le haut, à feuilles coriaces ornementales, profondément pennatilobées à lobes aigus rigides, terminées par une épine fauve. Capitule terminal volumineux involucre par les feuilles supérieures dont les plus internes sont dressées, pectinées très rigides et atteignant le haut du capitule sans le dépasser.

Péricline campanulé-urcéolé de 20-30 mm. à écailles vertes, panachées de blanc et parfois de violet, oblongues, lancéolées, triangulaires au sommet, terminées par une épine cuspidée fauve, fortement réfléchie pour les écailles supérieures.

Fleurs très blanches, les extérieures parfois un peu rosées. Celles-ci espacées au nombre de 12-20, tubuleuses puis ouvertes en languette étroitement lancéolée fortement radiante, donnant au capitule à leur niveau un diamètre de 5 à 7 cm. Achaines aranéeux, aigrette élégante en



Atractylis candida Cuénod.